

## ◆ [web版資料18 CQdelphi 2回目]

分類_カテゴリー	P_Patients	I_Intervention	C_Comparisons	第2回採点 平均値	第2回採点 中央値
その他④	腫瘍崩壊症候群患者	尿酸降下薬	対照	6.552	7
その他②	高尿酸血症患者 (尿酸値7-7.9mg/dl)	尿酸降下薬	対照	6.138	6
その他③	神経疾患を合併した痛風患者	XO阻害薬	対照	4.931	5
急性痛風①	急性痛風性関節炎の発作を起こしている患者	ステロイド NSAIDs コルヒチン	対照	7.964	8
急性痛風⑥	痛風発作が頻発する患者	長期間コルヒチンカバー	短期間コルヒチンカバー	7.143	7
急性痛風②	急性痛風性関節炎の 発作を起こしている患者	コルヒチンカバー	対照	7.000	7
急性痛風④	痛風発作を起こした患者	新規XO阻害薬	対照	6.750	7
急性痛風⑨	急性痛風性関節炎の 発作を起こしている患者	ステロイド関節内投与	ステロイド内服 対照	6.464	7
急性痛風③	痛風発作を起こしている患者	尿酸コントロール薬	対照	6.143	6
急性痛風⑤	痛風発作を起こしている患者	新規XO阻害薬	アロプリノール	5.536	6
結節③	痛風結節を有する患者	薬物治療により血清尿酸値を6mg/dl以下にする	対照	7.464	8
結節②	痛風結節を有する患者	薬物治療	対照	6.071	6
結節①	痛風結節を有する患者	結節摘出術	対照	4.607	5
高尿酸血症③	無症候性高尿酸血症の患者	食事	対照	6.897	7
高尿酸血症④	無症候性高尿酸血症の患者	尿酸コントロール薬	対照	6.793	7
高尿酸血症②	無症候性高尿酸血症の患者	運動療法	対照	6.724	7
心血管⑦	高尿酸血症合併 高血圧患者	尿酸降下薬	対照	7.536	8
心血管①	高尿酸血症合併心不全患者	尿酸コントロール薬	対照	7.250	7.5
心血管⑨	高尿酸血症合併 冠動脈疾患患者	尿酸降下薬	対照	6.929	7
心血管⑤	高尿酸血症患者の アルコール飲用する者	飲酒制限を指導する者	飲酒制限を指導しない者	6.464	6
心血管③	プリン体リッチ食を飲食する高尿酸血症患者	プリン体制限を 指導される患者	プリン体制限を 指導されない患者	6.286	6
腎⑧	腎障害を有する 高尿酸血症患者	尿酸降下薬	対照	7.929	8
腎⑤	腎障害を有する高尿酸血症 ・痛風患者	新規XO阻害薬	対照	7.857	8
腎①	無症候性高尿酸血症の患者	XO阻害薬	対照	7.071	7
腎②	無症候性高尿酸血症の患者	XO阻害薬	尿酸排泄促進薬	7.036	7
腎⑥	無症候性高尿酸血症患者	新規XO阻害薬	対照	6.714	7
腎④	無症候性高尿酸血症の患者	血清尿酸値7mg/dl以上で尿酸コントロール薬を 投与された患者	血清尿酸値8mg/dl以上で尿酸コントロール薬を投与さ れた患者	6.393	7