

◆ [web版資料17 CQdelphi 1回目]

分類_ カテゴリー	P_Patients	I_Intervention	C_Comparisons	第1回採点 平均値	第1回採点 中央値	第2回 採点
その他④	腫瘍崩壊症候群患者	尿酸降下薬	対照	6.607	7	
その他②	高尿酸血症患者 (尿酸値7-7.9mg/dl)	尿酸降下薬	対照	6.250	6	
その他③	神経疾患を合併した痛風患者	XO阻害薬	対照	5.464	5.5	
急性痛風①	急性痛風性関節炎の発作を起こしている患者	ステロイド NSAIDs コルヒチン	対照	7.667	8	
急性痛風⑥	痛風発作が頻発する患者	長期間コルヒチンカバー	短期間コルヒチンカバー	6.963	7	
急性痛風②	急性痛風性関節炎の 発作を起こしている患者	コルヒチンカバー	対照	6.815	7	
急性痛風④	痛風発作を起こした患者	新規XO阻害薬	対照	6.444	7	
急性痛風⑨	急性痛風性関節炎の 発作を起こしている患者	ステロイド関節内投与	ステロイド内服 対照	6.407	7	
急性痛風③	痛風発作を起こしている患者	尿酸コントロール薬	対照	6.222	6	
急性痛風⑤	痛風発作を起こしている患者	新規XO阻害薬	アロプリノール	5.963	6	
結節③	痛風結節を有する患者	薬物治療により血清尿酸値を6mg/dl以下にする	対照	7.333	8	
結節②	痛風結節を有する患者	薬物治療	対照	6.296	6	
結節①	痛風結節を有する患者	結節摘出術	対照	4.889	5	
高尿酸血症③	無症候性高尿酸血症の患者	食事	対照	7.034	7	
高尿酸血症④	無症候性高尿酸血症の患者	尿酸コントロール薬	対照	6.931	7	
高尿酸血症②	無症候性高尿酸血症の患者	運動療法	対照	6.655	7	
心血管⑦	高尿酸血症合併 高血圧患者	尿酸降下薬	対照	7.429	8	
心血管①	高尿酸血症合併心不全患者	尿酸コントロール薬	対照	7.143	8	
心血管⑨	高尿酸血症合併 冠動脈疾患患者	尿酸降下薬	対照	7.143	7.5	
心血管⑤	高尿酸血症患者の アルコール飲用する者	飲酒制限を指導する者	飲酒制限を指導しない者	6.5	7	
心血管③	プリン体リッチ食を飲食する高尿酸血症患者	プリン体制限を 指導される患者	プリン体制限を 指導されない患者	6.036	6.5	
腎⑤	腎障害を有する高尿酸血症 ・痛風患者	新規XO阻害薬	対照	7.593	8	
腎⑧	腎障害を有する 高尿酸血症患者	尿酸降下薬	対照	7.370	8	
腎①	無症候性高尿酸血症の患者	XO阻害薬	対照	7.222	7	
腎②	無症候性高尿酸血症の患者	XO阻害薬	尿酸排泄促進薬	7.185	7	
腎⑥	無症候性高尿酸血症患者	新規XO阻害薬	対照	7.0	7	
腎④	無症候性高尿酸血症の患者	血清尿酸値7mg/dl以上で尿酸コントロール薬を 投与された患者	血清尿酸値8mg/dl以上で尿酸コントロール薬を投与 された患者	6.556	7	